СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
_____ А. САВЕНКОВ
19 МАР 2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Салиномицин АВЗ

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: ВЕТ-3-4.26-5456/ПВР-3-4.26/04172

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
   торговое наименование: Салиномицин АВЗ (Salinomicin AVZ);
   международное непатентованное наименование: салиномицин.
2. Лекарственная форма: гранулы для приема внутрь.

Лекарственный препарат в 1 г содержит в качестве действующего вещества салиномицин - 120 мг, а также вспомогательное вещество: кальция карбонат.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой гранулы от почти белого до коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковки производителя – 2 года со дня производства, после первого вскрытия упаковки – 3 месяца. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 10 и 25 кг в пакеты из комбинированных материалов соответствующей вместимости. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается по рецепту (требованию) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: противококцидийные средства.

10. Салиномицин, входящий в состав лекарственного препарата, представляет собой продукт ферментации гриба *Streptomyces albus*, обладает широким спектром антикокцидийного действия, активен в отношении: *Eimeria tenella, E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. praecox, E. mitis* и других видов эймерий, паразитирующих у птиц.

Механизм действия салиномицина связан с нарушением переноса катионов натрия и калия у неполовозрелых форм кокцидий, что приводит к их гибели на стадии шизогонии.

После перорального применения препарат практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает антикокцидийное действие в слизистой оболочке кишечника. Выводится из организма преимущественно в неизменном виде с пометом.

Препарат по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Препарат применяют для профилактики эймериоза (кокцидиоза) у цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка кур.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность птицы к компонентам препарата. Запрещается применять лекарственный препарат курам-несушкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста, в связи с его накоплением в яйцах. Не применять птице других видов.

13. При работе с препаратом Салиномицин АВЗ следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Салиномицин АВЗ. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с моющим средством.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

14. Препарат не предназначен для применения млекопитающим.

15. Препарат применяют птице в смеси с кормом в дозе 500 г на 1 т корма (в пересчете на действующее вещество – 60 мг салиномицина на 1 кг корма, что соответствует 6 мг салиномицина на 1 кг массы тела птицы):

- цыплятам-бройлерам - с первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 7 дней до убоя;
- ремонтному молодняку кур - с первого дня жизни до 16-недельного возраста.

Для обеспечения равномерного распределения в корме суточную дозу лекарственного препарата тщательно смешивают с небольшим количеством комбикорма, а затем вносят при тщательном перемешивании в корм, рассчитанный на потребление птицей в течение суток.

Салиномицин АВЗ устойчив к кратковременному воздействию повышенной температуры и может использоваться при изготовлении гранулированного комбикорма при стандартных режимах гранулирования.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

17. При передозировке у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы. В этом случае необходимо прекратить введение препарата.

18. Не допускается применение лекарственного препарата одновременно с другими антикокцидийными средствами. Запрещается применение препарата совместно с тиамулином, а также в течение 7 суток до и в течение 7 суток после применения тиамулина. Лекарственный препарат совместим с кормами и кормовыми добавками, применяемыми в птицеводстве. Сведения о несовместимости лекарственного препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп отсутствуют.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной дозы применение препарата возобновляют в предусмотренной дозе и схеме применения. Не допускается превышение рекомендуемой дозы препарата для компенсации пропущенной.

21. Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток после окончания применения препарата. При вынужденном убое ранее установленного срока мясо птицы может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:	ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1/11.
Наименование, адрес и телефон организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:	ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1/11. Телефон горячей линии: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный). Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru.

Генеральный директор
ООО «НВЦ Агроветзащита» С.В. Енгашев