



ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Эйметерм раствор 2,5%

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-12.16-3458№ПВР-3-10.11/02734

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: торговое наименование – Эйметерм раствор 2,5% (Eumetherm 2,5 % solution); международное непатентованное наименование: толтразурил.
2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.
Лекарственный препарат в 1 мл в качестве действующего вещества содержит толтразурил – 25 мг, а также вспомогательные вещества: триэтаноламин и полиэтиленгликоль.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от желтого до коричневого цвета (допускается опалесценция).
Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.
4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 5, 10, 20, 50, 100 мл в полимерных флаконах, укупоренных навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия; по 5, 10, 20, 50, 100 мл в стеклянных флаконах и по 500 мл в стеклянных бутылках укупоренных резиновыми пробками укрепленных алюминиевыми колпачками; по 0,5 и 1 л в полимерных бутылках, по 2,5, 3 и 5 л в полимерных канистрах, соответствующей вместимости, укупоренных навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы по 5, 10, 20, 50 и 100 мл индивидуально помещают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению. Допускается выпуск флаконов по 100 мл без вторичной упаковки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Эймерм раствор 2,5% относится к лекарственным препаратам фармакотерапевтической группы – противокочидийные средства.

10. Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром кокцидиоцидного действия на все стадии внутриклеточного развития (мерогонии и гамогонии) кокцидий (эймерий), паразитирующих у птиц, в том числе *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria mitis*, *Eimeria adenoides*, *Eimeria adenoides*, *Eimeria meleagridis*, *Eimeria anseris*, *Eimeria truncata*, включая кокцидий, устойчивых к другим антикокцидийным средствам.

Толтразурил блокирует дыхательные ферменты и оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра кокцидий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов, вызывает гибель паразита.

После перорального введения препарата толтразурил медленно всасывается и оказывает кокцидиоцидное действие на слизистой и подслизистой оболочках желудочно-кишечного тракта. Выводится толтразурил из организма птиц в основном в неизменном виде, а также в виде метаболитов с пометом.

Эймерм раствор 2,5% по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не вызывает у птиц побочных явлений и осложнений, не препятствует формированию иммунитета к кокцидиозу.

III. Порядок применения

11. Эймерм раствор 2,5% назначают цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам, гусям и уткам с лечебной и лечебно-профилактической целью при кокцидиозе, а также при появлении у птиц первых клинических признаков заболевания.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Запрещается применение препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением толтразурила в яйцах.

13. При работе с Эймерм раствор 2,5% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эймерм раствор 2,5%. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Лекарственный препарат не предназначен для применения млекопитающим.

15. Эймерм раствор 2,5% применяют птицам с водой для поения два дня подряд в дозе 7 мг толтразурила на 1 кг массы птицы (28 мл препарата на 100 кг массы птицы), что эквивалентно:

- 1 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птицам в течение 48 часов подряд

или

- 3 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птицам по 8 часов в сутки два дня подряд.

В тяжелых случаях заболевания птиц лечение повторяют через 5 дней.

В период применения Эймерма раствора 2,5% птицы должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат.

Лечебный раствор сохраняет свое действие в течение 48 часов. В случае появления осадка раствор перед применением следует тщательно перемешать.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

18. Эймертерм раствор 2,5% совместим с витаминами, кормовыми добавками и лекарственными препаратами, применяемыми в птицеводстве.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. В случае не соблюдения установленного срока повторного применения препарата при тяжелом течении кокцидиоза его следует применить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

21. Убой цыплят-бройлеров на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, индеек, гусей и уток – не ранее, чем через 16 суток после последнего применения Эймертерм раствора 2,5%. В случае вынужденного убоя птиц ранее установленных сроков, мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11

Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93.

Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru