



ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Амоксиантарь 150

(Организация-разработчик: ФГБОУ ВО "РОСБИОТЕХ",
Россия, 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д.11)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-20.22-4922№ПВР-3-20.22/03760

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Амоксиантарь 150 (Amoxiyantar 150);
международное непатентованное наименование: амоксициллин.
2. Лекарственная форма: суспензия для внутримышечного и подкожного введения.
Амоксиантарь 150 в качестве действующего вещества в 1 мл содержит амоксициллина тригидрат – 150 мг, а также вспомогательные вещества: янтарная кислота, бутилгидрокситолуол, твин-80 и пропиленгликоль дикаприлат/дикапрат.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой суспензию от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.
4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянных или полимерных флаконах соответствующей вместимости, укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми или алюмопластиковыми колпачками с контролем первого вскрытия. Флаконы поштучно помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению препарата.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается по рецепту (требованию) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. Амоксиантарь 150 относится к лекарственным препаратам фармакотерапевтической группы пенициллинов.

10. Амоксициллин, входящий в состав препарата, обладает широким спектром бактерицидной активности против большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp., *Clostridium* spp., *Bacillus anthracis*, *Actinomyces bovis*, *Peptostreptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Campylobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Pasteurella* spp., *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides*, *Haemophilus* spp., *Moraxella* spp., *Actinobacillus pleuropneumoniae* и *Actinobacillus lignieresii*.

Амоксициллин - полусинтетический антибиотик группы пенициллинов. Механизм антибактериального действия амоксициллина заключается в подавлении функциональной активности бактериальных ферментов транспептидаз, участвующих в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов пептидогликана, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки. Амоксициллин является лекарственным средством первого выбора, применяемым при появлении симптомов заболевания на основании предварительного диагноза.

После парентерального введения препарата максимальная концентрация амоксициллина в сыворотке крови достигается через 1-2 часа и удерживается на терапевтическом уровне в течение 48 часов. Амоксициллин выводится из организма с мочой и фекалиями в основном в неизмененной форме.

Амоксиантарь 150 по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Амоксиантарь 150 применяют для лечения крупного рогатого скота, свиней, овец и коз при болезнях бактериальной этиологии желудочно-кишечного тракта, дыхательной и мочеполовой системы, кожи, суставов и мягких тканей, в том числе при некробактериозе, пупочных инфекциях, атрофическом рините, синдроме метрит-мастит-агалактия и других первичных и вторичных инфекциях, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата, а также выраженные нарушения функций печени и/или почек.

13. При работе с Амоксиантарь 150 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Амоксиантарь 150. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с моющим средством. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз его следует тотчас удалить тампоном, а затем смыть моющим средством и большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

14. Возможность применения лекарственного препарата беременным и кормящим самкам, а также новорожденному молодняку определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки отношения пользы к возможному риску применения препарата.

15. Амоксиантарь 150 вводят животным парентерально однократно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного: крупному рогатому скоту, овцам и козам внутримышечно или подкожно, свиньям - внутримышечно. При необходимости инъекцию повторяют через 48 часов.

Перед каждым введением флакон следует встряхнуть до образования однородной суспензии.

Максимальный объем введения лекарственного препарата в одно место не должен превышать для крупного рогатого скота – 20 мл, свиней – 10 мл, овец, коз и телят – 5 мл.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях в месте инъекции возможно развитие отека, который рассасывается самопроизвольно в течение 1-2 суток. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций, использование препарата прекращают и, при необходимости, животному проводят десенсибилизирующую терапию.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, нарушение функций желудочно-кишечного тракта, отечность в месте введения. При необходимости животному назначают средства симптоматической терапии.

18. Амоксиантарь 150 не следует применять одновременно с другими β -лактамами препаратами, а также с бактериостатическими антибиотиками (тетрациклины и макролиды), сульфаниламидами, тиамфениколом, хлорамфениколом, фторхинолонами, а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не выявлено.

20. Лекарственный препарат применяют, как правило, однократно. При необходимости повторного введения препарата, не следует увеличивать 48-часовой интервал, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности.

21. Убой крупного рогатого скота, овец и коз на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток, свиней – не ранее, чем через 14 суток после последнего применения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 96 часов после последнего введения препарата. Молоко, полученное в период лечения и в течение 96 часов после последнего введения препарата, после кипячения может быть использовано в корм животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11.

Телефон горячей линии: 8-800-700-19-93.
Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru

Генеральный директор ООО «АВЗ С-П» А.А. Касьянов

