



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

А.А. САВЕНКОВ

11.0 СЕН 2025

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
ОФТАЛЬМИКА® мазь глазная

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения 77-3-17.25-5367N/ПВР-3-17.25/0423

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование – ОФТАЛЬМИКА® мазь глазная (Ophthalmica eye ointment);

международные непатентованные наименования – азитромицин, неомицин, полимиксин В.

2. Лекарственная форма: мазь глазная.

Лекарственный препарат в качестве действующих веществ содержит в 1 г: азитромицина дигидрат – 15 мг, неомицина сульфат – 5 мг, полимиксина В сульфат – 10 000 МЕ, а также вспомогательные вещества: парафин жидкий, ланолин, нипагин, нипазол, вазелин.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную мазь от бесцветного до светло-желтого цвета, допускается коричневатый оттенок, консистенция мягкая.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства; после первого вскрытия упаковки – 28 суток. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 5 г в полимерные тубы, помещенные в картонные пачки. Каждую потребительскую упаковку сопровождают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 8 °С. Допускается однократная транспортировка лекарственного препарата при температуре от 2 °С до 25 °С в течение не более, чем 14 суток.

6. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается по рецепту (требованию) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. ОФТАЛЬМИКА® мазь глазная относится к группе офтальмологических средств в комбинации.

10. ОФТАЛЬМИКА® мазь глазная обладает широким спектром антибактериальной активности.

Азитромицин – антибиотик группы макролидов-азалидов II поколения. Эффективен против глазных инфекций, вызванных грамположительными, грамотрицательными и атипичными бактериями, в том числе хламидиями.

Механизм действия азитромицина заключается в связывании с 50S субъединицей рибосом бактерий, что препятствует транслокации пептидов, тем самым ингибируя синтез белков.

Неомицин – антибиотик широкого спектра действия, относящийся к группе аминогликозиды. Ингибирует рост большинства грамположительных и грамотрицательных палочек, многих грамположительных кокков и кислотоустойчивых микроорганизмов.

Механизм действия неомицина заключается в присоединении его к 30S субъединице рибосом бактериальных клеток, в результате чего из-за ошибок в трансляции мРНК нарушается синтез белка.

Полимиксин В – антибиотик группы полипептидов, используется для лечения инфекционных болезней, вызванных грамотрицательными бактериями.

Механизм действия полимиксина В заключается в нарушении целостности цитоплазматической мембраны бактерий.

При местном применении действующие вещества ОФТАЛЬМИКА® мази глазной не всасываются в системный кровоток и оказывают антимикробное действие в тканях глаза.

После однократного применения препарата ОФТАЛЬМИКА® мазь глазная действующие вещества проникают в роговицу, ткани века, конъюнктиву и внутриглазную жидкость и сохраняют терапевтические концентрации до 12 часов.

Препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат ОФТАЛЬМИКА® мазь глазная назначают собакам и кошкам для лечения и профилактики бактериальных, хламидийных, микоплазменных офтальмологических заболеваний: ячменя и блефаритов у собак, гнойного, гнойно-катарального и катарального конъюнктивитов, кератитов, кератоконъюнктивитов, воспалительных заболеваний придатков глаза, вызванных чувствительными к компонентам препарата возбудителями. В целях профилактики гнойных заболеваний глаз при повреждениях глазного яблока или попадании инородных тел. При операциях на глазном яблоке и веках в предоперационном и послеоперационном периоде. В комплексном лечении герпесвируса и офтальмохламидиоза у кошек и синдрома сухого глаза у собак. При отсутствии эффекта при лечении другими антимикробными препаратами.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с препаратом ОФТАЛЬМИКА® мазь глазная следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ОФТАЛЬМИКА® мазью глазной. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством чистой воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Возможность применения лекарственного препарата животным в период беременности и лактации определяет лечащий врач на основании оценки соответствия пользы к возможному риску его применения.

15. Лекарственный препарат с лечебной и профилактической целью закладывают по 0,3 см в конъюнктивальный мешок. Аккуратно массируют нижнее веко животного с целью лучшего распределения мази.

Длительность курса в зависимости от показаний в соответствии с таблицей:

Показания	Длительность курса, дней
Ячмень и блефариты у собак	3 раза в день в течение 10 дней
Гнойный, гнойно-катаральный, катаральный конъюнктивит	3 раза в день в течение 10 дней
Кератит и кератоконъюнктивит	3 раза в день в течение 10 дней
Воспалительные заболевания придатков глаза	2 раза в день в течение 10 дней

Профилактика гнойных заболеваний глаз при повреждениях глазного яблока или попадании инородных тел	2 раза в день в течение 10 дней
При операциях на глазном яблоке и веках в предоперационном и послеоперационном периоде	2 раза в день в течение 10 дней
Комплексное лечение герпесвируса у кошек	3 раза в день в течение 14 дней
Комплексное лечение офтальмохламидиоза у кошек	3 раза в день в течение 14 дней
Комплексное лечение синдрома сухого глаза у собак	3 раза в день в течение 14 дней
При отсутствии эффекта при лечении другими антимикробными препаратами	3 раза в день в течение 14 дней

Для сохранения стерильности лекарственного препарата не следует касаться поверхности глаза губой.

При наличии обильных гнойных или слизисто-гнойных выделений из глаз перед применением препарата проводят предварительную гигиеническую обработку.

16. При применении препарата ОФТАЛЬМИКА® мазь глазная в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций его применение прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомов передозировки лекарственным препаратом не установлено.

18. Сведения о несовместимости лекарственного препарата с лекарственными препаратами других фармакологических групп, кормами и кормовыми добавками отсутствуют.

При назначении лекарственного препарата вместе с каплями глазными следует сначала закапывать капли. Мазь можно наносить не ранее, чем через 5 минут.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередного применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению её терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в той же дозе по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения. ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11

Наименование, адрес организации, ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
уполномоченной держателем или Московской область, г.о. Сергиево-
владельцем регистрационного Посадский, г. Сергиев Посад, ул.
удостоверения лекарственного препарата Центральная, д. 1/11
на принятие претензий от потребителя.

Телефон круглосуточной «Горячей
линии»: 8-800-700-19-93

Информация о лекарственном
препарате размещена на сайте
www.avzvet.ru

Генеральный директор

С.В. Енгашев

