

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А.НЕПОКЛОНОВ

16 ИЮН 2014

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Волстар для нормализации обмена веществ у сельскохозяйственной птицы и свиней
(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Волстар (Volstar) – кормовая добавка для нормализации обмена веществ у сельскохозяйственной птицы и свиней.

2. Волстар в 1 мл в качестве действующих веществ содержит витамин А (ретинол) – 50000 МЕ; витамин D₃ (холекальциферол) – 2000 МЕ, витамин Е (токоферол) – 30 мг, витамин С (аскорбиновая кислота) – 100 мг, а также вспомогательные вещества: полисорбат-80 - 200 мг, 2-пирролидон – 40 мг и вода очищенная до 1 мл.

Допустимые отклонения содержания компонентов от предусмотренных по рецептуре должно быть не более 15%.

Волстар не содержит генно-инженерно – модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду кормовая добавка представляет собой прозрачную, жидкость от зеленовато - желтого до светло-коричневого цвета, хорошо растворимую в воде. Допускается опалесценция.

4. Выпускают Волстар расфасованным в стеклянные флаконы 100 мл, укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками; в полимерные флаконы по 100 и 250 мл; укупоренные навинчиваляемыми крышками с контролем первого вскрытия; в полимерные бутылки или канистры по 500; 1000; 2500 и 5000 мл, укупоренные навинчиваляемыми крышками с контролем первого вскрытия.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования организации-производителя, товарного знака и адреса, наименования, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, номера партии, объема, даты изготовления, информации о соответствии, обозначения СТО, надписи «Для животных».

Хранят и транспортируют добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 5°C до 25°C.

Срок хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается использовать Волстар по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Волстар восполняет недостаток витаминов в организме свиней и сельскохозяйственной птицы, обладает комплексным действием, направленным на улучшение продуктивности при интенсивном животноводстве и птицеводстве, повышает усвояемость корма и обмен веществ, повышает защитные функции организма.

Входящие в состав добавки витамин А регулирует функцию и регенерацию эпителиальных тканей, тем самым повышая защитную функцию организма животных и птиц; витамин D₃ регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, обладает противорахитическим действием; витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃; витамин С является важным фактором нормального роста организма, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, и повышает защитные функции организма. Волстар по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

6. Волстар применяют для нормализации обмена веществ в условиях стресса, задержке роста и недостаточном привесе, а также для повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственной птицы и свиней.

7. Волстар добавляют в воду для поения свиней и сельскохозяйственных птиц всех возрастных групп ежедневно в течение 3-5 дней.

Нормы ввода:

- взрослому поголовью свиней – 1мл/50кг, молодняку - 0,5 мл/10кг массы животного в день.

- сельскохозяйственной птице - 0,5 л на 1000 л воды.

Бройлерам в период с 8 по 13 день, ремонтному молодняку кур в течение 2-3 дней при стрессах разной этиологии, также племенным курам для повышения инкубационных качеств яиц в течение 1-3 дней в зависимости от физиологического состояния птицы и качества кормления.

При несбалансированном рационе:

- взрослому поголовью свиней – 1,5мл/50кг, молодняку -1мл/10 кг массы животного в день.

- сельскохозяйственной птице - 1,0 л на 1000 л воды.

8. Побочных явлений и осложнений при применении добавки согласно инструкции не выявлено.

9. Волстар совместим с лекарственными средствами и кормовыми добавками, применяемыми в животноводстве и птицеводстве.

10. Продукция животного происхождения во время и после применения кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией может быть использована без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с кормовыми добавками.

12. Добавку следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «НВЦ Агроветзащита», 129329, Россия, г. Москва, Кольская ул., 1, стр. 1.

Адрес организации-производителя: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.» 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., 1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения