

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А.ВЛАСОВ

21.12.2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата Капли глазные
АЛЕЗАН[®] для лечения и профилактики офтальмологических
заболеваний у лошадей

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329,
г. Москва, Игарский проезд, д. 4)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли глазные АЛЕЗАН[®]
(Eye drops ALEZAN[®]).

Международное непатентованное наименование действующих веществ:
хлоргексидин, таурин, янтарная кислота.

2. Лекарственная форма: капли глазные.

Капли глазные АЛЕЗАН[®] в 1 мл в качестве действующих веществ содержат
хлоргексидина биглюконат – 0,15 мг, таурин – 20 мг и янтарную кислоту – 1 мг,
а в качестве вспомогательного вещества воду для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой
прозрачную жидкость светло-голубого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в
закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после первого
вскрытия флакона – 28 суток.

Запрещается применение Капель глазных АЛЕЗАН[®] по истечении срока
годности.

4. Выпускают Капли глазные АЛЕЗАН[®] расфасованными по 10, 15, 20, 25 и
30 мл в полимерные флаконы-капельницы, укупоренные навинчиваемыми
полимерными крышками с контролем первого вскрытия; по 10, 15, 20 и 30 мл в
стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и обкатанные
алюминиевыми колпачками.

Флаконы помещают поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по
применению.

5. Хранят Капли глазные АЛЕЗАН[®] в закрытой упаковке производителя, в
защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и
кормов, при температуре от 5°С до 25°С.

6. Капли глазные АЛЕЗАН[®] следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с
требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Капли глазные АЛЕЗАН® относятся к группе комбинированных офтальмологических лекарственных препаратов.

10. Лекарственный препарат обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Хлоргексидина биглюконат оказывает быстро проявляющееся бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дерматофиты и липофильные вирусы. Механизм его действия заключается в связывании катионов, образующихся в результате диссоциации солей хлоргексидина, стенками бактериальных клеток, нарушении осмотического равновесия и мембранной функции клеток, что приводит к снижению уровня клеточной АТФ и гибели микроорганизма.

Таурин и янтарная кислота нормализуют окислительно-восстановительные процессы, оказывают репаративное (восстанавливающее) действие, замедляют развитие катаракты и профилактируют дегенеративные и дистрофические нарушения в сетчатке и хрусталике.

Капли глазные АЛЕЗАН® по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают местно-раздражающего и алергизирующего действия.

III. Порядок применения

11. Капли глазные АЛЕЗАН® назначают спортивным лошадям для повседневной гигиенической обработки глаз (удаления засохшего экссудата в углах глаз) при избыточном слезотечении, воспалении слизистой оболочки, с лечебной и профилактической целью при острых и хронических катаральных и серозно-катаральных конъюнктивитах, после травм и попадания инородных тел, а также в целях профилактики катаракты и возрастных дегенеративных и дистрофических изменений сетчатки и роговицы.

12. Противопоказанием к применению Капель глазных АЛЕЗАН® является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Для повседневного туалета глаз и при конъюнктивитах легкой степени смоченным препаратом стерильным марлевым тампоном удаляют из внутреннего угла глаза экссудат и корочки, после чего закапывают в конъюнктивальную полость 3-4 капли препарата. Дозу, кратность и продолжительность курса применения препарата определяет лечащий ветеринарный врач в зависимости от физиологического состояния животного и течения болезни:

- при обработке глаз 1 раз в день препарат применяют не более 45 дней, после чего делают 10-дневный перерыв;

- при обработке глаз 2 раза в день препарат применяют не более 20 дней, после чего делают 7-дневный перерыв;

- при обработке глаз 3 раза в день препарат применяют не более 14 дней, после чего делают 5-дневный перерыв.

При избыточном слезотечении, травмах, попадании инородных предметов или раздражающих веществ, препарат закапывают по 3-4 капли 3 раза в день в течение 5-14 дней.

С целью профилактики катаракты, возрастных дегенеративных изменений сетчатки и роговицы препарат применяют по 3-4 капли 2 раза в день курсами по

20 дней с 10-дневным интервалом.

14. Симптомы передозировки препарата не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

16. Специальных исследований по применению Капель глазных АЛЕЗАН® беременным самкам и новорожденным животным не проводилось. Возможность применения препарата этим группам животных определяет лечащий ветеринарный на основании оценки соотношения пользы к возможному риску его применения. При необходимости возможно применение препарата самкам в период лактации.

17. Следует избегать нарушений схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению эффективности. При пропуске очередной обработки лекарственный препарат необходимо ввести как можно скорее в предусмотренной данной инструкцией дозе.

18. При применении Капель глазных АЛЕЗАН® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного препарата и появлении у животного аллергических реакций (продолжается или нарастает конъюнктивальная гиперемия) использование препарата прекращают и назначают животному десенсибилизирующую терапию.

19. При совместном использовании с другими офтальмологическими лекарственными средствами интервал между их введением должен составлять не менее 5 минут. Сведения о несовместимости Капель глазных АЛЕЗАН® с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют.

20. Капли глазные АЛЕЗАН® не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с лекарственным препаратом Капли глазные АЛЕЗАН® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей ее необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Каплями глазными АЛЕЗАН®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Центральная, д. 1.

Наименование и адрес
организации, уполномоченной
держателем или владельцем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на
принятие претензий от потребителя

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Центральная, д. 1.

С вступлением в действие настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Капель глазных Алезан, утвержденная Россельхознадзором 13 декабря 2013 года.

Номер регистрационного удостоверения: 47-3-15,17-3947/17BP-3-5.8/02196