

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета ветеринарного
контроля и надзора МСХ РК

С. Сакумбаев А.Ш.
« 21 » 01 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
ЭНТРИКИМ 5% (10%) для лечения сельскохозяйственных животных и
птицы при болезнях бактериальной этиологии
(Организация-разработчик: ООО «НПФ «АЛИСА», Россия, 117042, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, проезд Чечёрский, д. 120, по-
мещ. 1/1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: ЭНТРИКИМ 5% (10%) (Entrikim 5% (10%).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: тилмикозин, энрофлоксацин и триметоприм.

2. Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.

3. Выпускают лекарственный препарат в двух модификациях, содержащих в качестве действующих веществ в 1 мл:

ЭНТРИКИМ 5% - тилмикозина фосфат - 50 мг, энрофлоксацин - 50 мг, триметоприм - 25 мг; ЭНТРИКИМ 10% - тилмикозина фосфат - 100 мг, энрофлоксацин - 100 мг, триметоприм - 50 мг.

В качестве вспомогательных веществ лекарственный препарат содержит молочную кислоту и воду очищенную.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 100 мл в полимерные флаконы, по 1 л в полимерные бутылки и по 5 л в полимерные канистры, укупоренные завинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия.

Каждая единица потребительской упаковки сопровождается инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость от желтого до коричневого цвета.

6. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Срок годности после вскрытия упаковки не более 28 суток.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

7. ЭНТРИКИМ 5% (10%) хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.

8. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

9. Неиспользуемый препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

10. ЭНТРИКИМ 5% (10%) отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

Применение ЭНТРИКИМ 5% (10%) необходимо проводить под контролем ветеринарного врача.

Тилмикозина фосфат в составе препарата - полусинтетический антибиотик из группы макролидов с широким спектром действия. Активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Pasteurella* spp., *Clostridium* spp., *Arcanobacterium* spp. (*Corynebacterium*), *Brachyspira hyodysenteriae*, *Chlamydia* spp., *Spirocheta* spp., *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mannheimia haemolytica* и *Mycoplasma* spp.

Механизм бактериостатического действия тилмикозина заключается в блокировании белкового синтеза в микробной клетке на рибосомальном уровне.

Энрофлоксацин является сильным противомикробным средством последнего поколения из группы фторхинолонов. Энрофлоксацин действует бактерицидно, направленно блокируя фермент микробного ядра - ДНК-гиразу, препятствуя, таким образом, образованию внешней оболочки. Отличительной особенностью энрофлоксацина является его широчайший спектр действия, охватывающий Грамм (-) бактерии и микоплазмы.

Триметоприм - противомикробное средство широкого спектра действия из группы диаминопиримидинов. Препарат обладает противомикробным действием в отношении Грамм (+) и Грамм (-) микроорганизмов *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Salmonella* spp., *Pasteurella* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus* spp.,

Shigella spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Haemophilus* spp., *Chlamydia* spp.

При пероральном введении ЭНТРИКИМ 5% (10%) хорошо и быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей. Выводится, в основном, с калом.

ЭНТРИКИМ 5% (10%) по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам, в рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и гепатотоксическим свойством.

III. Порядок применения

ЭНТРИКИМ 5% (10%) применяют сельскохозяйственным животным и птице при колибактериозе, сальмонеллёзе, хронических респираторных заболеваниях, стрептококкозе, некротическом энтерите, гемофилёзе, микоплазмозе, смешанных и вторичных инфекциях, возбудители которых чувствительны к действующим веществам препарата.

Запрещается применение препарата животным, чувствительным к компонентам препарата, взрослым жвачным животным с развитым рубцовым пищеварением, а также курам-несушкам в связи с накоплением тилмикозина, энрофлоксацина и триметоприма в яйцах. Не применяют животным с нарушениями функции почек и/или печени.

Лекарственный препарат применяют животным и птице индивидуально или групповым способом перорально с водой для поения один раз в сутки в течение 3-5 суток в следующих дозах:

- Птице применяют ЭНТРИКИМ 5% в суточной дозе 1-2 мл/л воды для поения, ЭНТРИКИМ 10% в суточной дозе 0,5-1 мл/л воды. Молодняку птицы препарат применяют в указанной дозе на протяжении первых 3-х дней жизни, с последующей обработкой на 20-22 сутки жизни на протяжении еще 3-х суток;

- Свиньям, телятам, козлятам и ягнятам препарат применяют с водой для поения или заменителем молока в дозе: ЭНТРИКИМ 5% - 1-2 мл на 10 кг массы тела, ЭНТРИКИМ 10% - 0,5-1 мл на 10 кг массы тела животного.

В период лечения животные и птица должны получать только воду, содержащую препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток. В случае приготовления маточного раствора ЭНТРИКИМ 5% (10%) необходимо добавлять в воду, а не наоборот. Воду, в которую добавлен лекарственный препарат, обновляют каждые 24 часа.

Особых условий содержания в период и после применения препарата не требуется.

При пропуске одной или нескольких доз препарата необходимо возобно-

вить лечение как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

Запрещается применение препарата совместно с бактериостатическими антибиотиками (левомицетином, тетрациклином), теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами, а также препаратами магния и кальция.

Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 12 суток после последнего применения препарата.

Мясо от животных, вынужденно убитых до истечения срока 12 суток после применения препарата, может быть использовано в корм пушным зверям или для переработки на мясокостную муку.

IV. Меры личной профилактики

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с препаратом руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустую тару из-под ЭНТРИКИМ 5 % (10%) запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Организация-разработчик:

ООО «НПФ «АЛИСА»,
Россия, 117042, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Южное Бутово,
проезд Чечёрский, д. 120, помещ. 1/1.
ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г.о. Сергиево-
Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Цен-
тральная, д.1/11.

Наименования и адреса производствен-
ных площадок производителя лекар-
ственного препарата для ветеринарного
применения:

Организация-разработчик уполномочена
на принятие претензий от потребителя.