



К.А. САВЕНКОВ  
19.08.2021

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
**ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ®** капли для регуляции половой охоты

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,  
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-7.19-4479 № ПВР-3-1.14/03025

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капли для регуляции половой охоты («Four with a tail» drops for the regulation of estrus).

международное непатентованное наименование: мегэстрол.

2. Лекарственная форма: суспензия для орального применения.

ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капли для регуляции половой охоты в 1 мл содержат в качестве действующего вещества мегестрола ацетат – 20 мг, а также вспомогательные вещества: лецитин, сорбит, аскорбиновую кислоту и воду очищенную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от светло-желтого до желтого цвета. Допускается коричневатый оттенок.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, после вскрытия флакона-капельницы – 28 суток. Запрещается применять по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 2, 2,5, 3 и 5 мл в полимерные флаконы-капельницы с навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия. Флаконы-капельницы упаковывают индивидуально в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °C до 25 °C.

6. ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капли для регуляции половой охоты следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капли для регуляции половой охоты относятся к фармакотерапевтической группе гормоны и их антагонисты.

10. Мегестрола ацетат, входящий в состав препарата, представляет собой синтетическое производное гормона прогестагена. Механизм его действия заключается в воздействии на гипоталамо-гипофизарную систему, способности ингибировать секрецию лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, вырабатываемых передней долей гипофиза. Снижение уровня гонадотропных гормонов при использовании препарата до начала эструса (течки) приводит к угнетению синтеза эстрогенов фолликулами яичников, что предотвращает развитие морфологических и психофизиологических изменений у самок, связанных совым циклом, при недостаточном количестве ЛГ, процесс овуляции становится невозможным. При применении препарата самкам на 2 или 3 день от начала эструса происходит прерывание течки. Снижение уровня гонадотропных гормонов в крови подавляет развитие гормонозависимых новообразований.

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и оказывает опосредованное влияние на регуляцию полового поведения и связанные с ней поведенческие реакции, снижая агрессию, беспокойство и повышенную возбудимость.

При отмене препарата концентрация мегестрола ацетата в организме снижается, восстанавливается физиологический уровень ЛГ и ФСГ в крови животного, прекращается контрацептивное действие препарата и восстанавливается половой цикл.

Мегестрола ацетат легко всасывается в кишечнике, биотрансформируется в печени и в течение 1-2 дней в виде глюкуроновых солей полностью выводится из организма животных с мочой.

По степени воздействия на организм ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капли для регуляции половой охоты относятся к группе малоопасных веществ (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капли для регуляции половой охоты назначают для контрацепции и регуляции полового возбуждения: сукам и кошкам – для задержки, прерывания течки, снятия симптомов ложной беременности и лактации, кобелям и котам – для снижения половой активности и коррекции поведения.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли, сахарный диабет, гормональные нарушения. Не следует применять препарат неполовозрелым животным, сукам и кошкам, начиная с 3 суток от начала течки, в период беременности и лактации.

13. При работе с препаратом ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капли для регуляции половой охоты следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® каплями для регуляции половой охоты. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Запрещается применение препарата ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капли для регуляции половой охоты беременным и лактирующим самкам, а также неполовозрелым животным.

**15. ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ®** капли для регуляции половой охоты применяют животным индивидуально перорально (внутрь) за 1-2 часа до кормления, капая с помощью капельницы на корень языка или кусочек лакомства. Перед применением флакон с препаратом согреть в ладонях и встрихнуть.

Кошкам назначают ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капли для регуляции половой охоты с учетом показаний по следующей схеме:

- для прерывания течки (не позднее 3 суток после ее начала) – ежедневно, в дозе по 6 капель (0,3 мл) в течение 8 дней;

- для задержки течки (начать в период анэстроза - период между течками) - в дозе по 6 капель (0,3 мл) один раз в 2 недели при продолжительности курса не более 18 месяцев.

Перед началом нового курса применения рекомендуется сделать перерыв сроком не менее 2-х месяцев. Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального физиологического полового цикла.

Сукам, в зависимости от массы тела, назначают препарат согласно указанной схемы:

- для задержки течки препарат начинают давать за 7-15 дней до начала течки. Дозировка с учетом массы животного представлена в таблице 1. Длительность применения зависит от желаемого срока задержки течки, но не более 32 дней. Течка может начаться через несколько дней после прекращения дачи препарата. При длительном применении препарата (около месяца), течка обычно начинается через 4-6, иногда через 2-9 месяцев;

Таблица 1

Масса животного, кг	Суточные дозы препарата с целью задержки течки у сук		
	мегестрола ацетат, мг	капель	мл
до 5	2,5	3	0,15
6-10	5	6	0,25
11-15	7,5	8	0,4
16-20	10	10	0,5
21-30	15	15	0,75
31-40	20	20	1
41-50	25	25	1,25
51-60	30	30	1,5

- для прерывания течки дают при появлении первых ее признаков (не позднее 3 суток после ее начала). Дозировка с учетом массы животного представлена в таблице 2. В течение первых 3-х дней курса дают суточную дозу, затем в течение последующих 7-и дней половину суточной дозы. После прекращения дачи препарата течка обычно начинается через 4-6, иногда через 2-9 месяцев.

Таблица 2

Масса животного, кг	Суточные дозы препарата для прерывания течки у сук		
	мегестрола ацетат, мг	капель	мл
до 5	10	10	0,5
6-10	20	20	1
11-15	30	30	1,5
16-20	40	40	2
21-30	60	60	3
31-40	80	80	4
41-50	100	100	5
51-60	120	120	6

Сукам лекарственный препарат рекомендуется применять не более двух раз в год.

Самцам для снижения половой активности и коррекции поведения препарат применяют в следующих суточных дозах:

- котам по 6 капель (0,3 мл) ежедневно в течение 5-7 дней, затем 1 раз в неделю до достижения коррекции поведения;

- кобелям по 10 капель (0,5 мл) на 5 кг массы животного ежедневно первые 7 дней, следующие 14 дней - половина суточной дозы.

16. При применении ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капель для регуляции половой охоты в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможно увеличение массы животного, незначительное угнетение или агрессивность. У отдельных животных при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или при его длительном применении возможны обильное слюнотечение, рвота, изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочной железы. В этих случаях применение препарата следует прекратить и при необходимости назначить симптоматические средства.

17. В случае передозировки препарата возможно развитие патологических изменений в тканях матки и яичников, гипертрофия молочных желез, незначительное увеличение массы животного, повышение аппетита, апатичность.

18. Не рекомендуется длительное совместное применение ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ® капель для регуляции половой охоты с кортикоステроидами. Информация о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп, кормовыми добавками и кормами отсутствует.

19. Особеностей действия препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1

Генеральный директор

С. В. Енгашев

