



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

И. А. САВЕНКОВ

13 ЯНВ 2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
МАСТИБЛОК® DC 30

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-10.24-5162№ПВР-3-10.24/03970

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: МАСТИБЛОК® DC 30 (Mastiblock DC 30);
международное непатентованное наименование: клоксациллин.
2. Лекарственная форма: суспензия для интрацестерального введения.
МАСТИБЛОК® DC 30 в качестве действующего вещества в 1 шприце содержит клоксациллин (в форме соли бензатиновой кислоты) – 500 мг, а в качестве вспомогательных веществ – алюминия моностеарат и парафин жидкий.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой суспензию от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.
- Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 4 года со дня производства. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.
4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 3 г в полимерные шприцы-дозаторы, поштучно упакованные в пленку. Шприцы-дозаторы помещают в картонные коробки по 24 и 48 штук. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.
6. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается по рецепту (требованию) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: пенициллины.
10. Клоксациллин, входящий в состав препарата, является антибиотиком широкого спектра действия, активен в отношении грамположительных бактерий, наиболее часто выделяемых из секрета вымени, в том числе *Streptococcus* spp. (включая *Streptococcus agalactiae*), *Staphylococcus* spp. (включая штаммы, резистентные к пенициллину) и *Corynebacterium bovis*.

Механизм антибактериального действия клоксациллина заключается в ингибировании бактериальных ферментов транспептидаз, что препятствует связыванию основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана и приводит к гибели бактерий.

МАСТИБЛОК® DC 30 создает высокий уровень клоксациллина в тканях вымени, не оказывает раздражающего действия. Благодаря комбинированному действию малорастворимой бензатиновой соли клоксациллина, терапевтическое влияние лекарственного препарата у сухостойных коров продолжается до 4 недель. Из организма клоксациллин выводится с мочой и фекалиями, у лактирующих животных также с молоком.

МАСТИБЛОК® DC 30 по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. МАСТИБЛОК® DC 30 применяют для профилактики и лечения мастита бактериальной этиологии у коров в сухостойный период.

12. Противопоказанием к применению МАСТИБЛОК® DC 30 является повышенная индивидуальная чувствительность животного к β -лактамам антибиотикам.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с МАСТИБЛОК® DC 30. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Разрешается применение препарата в период стельности, но не позднее 30 дней до предполагаемого отела, в связи с выделением клоксациллина с молоком. Препарат не предназначен для применения в период лактации.

15. МАСТИБЛОК® DC 30 вводят коровам однократно, интрацистернально сразу по завершении лактационного периода, в дозе по 3 г (содержимое одного шприца-дозатора) в каждую четверть вымени.

Перед применением препарат в шприце-дозаторе следует тщательно взболтать.

Перед введением суспензии, из всех четвертей вымени выдаивают молоко, соски протирают антисептическим раствором. Со шприца-дозатора снимают крышку, после этого его канюлю вводят в канал соска и осторожно выдавливают содержимое в четверть вымени; затем канюлю извлекают, верхушку соска пережимают пальцами на 1-2 минуты и слегка массируют сосок снизу вверх.

16. Побочных явлений и осложнений при применении МАСТИБЛОК® DC 30 в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическое лечение.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Информация о несовместимости МАСТИБЛОК® DC 30 с другими лекарственными препаратами отсутствует. Не следует применять МАСТИБЛОК® DC 30 совместно с другими препаратами для интрацистернального применения.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и при отмене не выявлено.

20. Препарат предназначен для однократного применения.

21. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего применения МАСТИБЛОК® ДС 30. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных животных.

Молоко в пищевых целях после применения МАСТИБЛОК® ДС 30 в соответствии с настоящей инструкцией можно использовать не ранее чем через 5 суток после отела коров. Молоко, полученное ранее установленного срока из здоровых четвертей вымени, можно использовать в корм животным после кипячения. Молоко из больных четвертей вымени обезвреживают кипячением и утилизируют.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11

Телефон горячей линии: 8-800-700-19-93
Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru

Генеральный директор



С.В. Енгашев