



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата Эйметерм диклазурил

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита, Россия,  
129329, г. Москва, Игарский проезд, д.4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения 74-3-18.12-3910КПВР-3-18.12/02858

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Эйметерм диклазурил (Eimeterm diklazuril).

международное непатентованное наименование: диклазурил.

2. Лекарственная форма: гранулы для приема внутрь.

Эйметерм диклазурил содержит в 1 г в качестве действующего вещества диклазурил – 2 мг, а также вспомогательные вещества: лактозу, крахмал картофельный, лактулозу.

3. По внешнему виду препарат представляет собой гранулы от белого до серого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – 3 месяца. Не применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Эйметерм диклазурил расфасованным по 1 кг в пакеты из комбинированных материалов; по 1 кг в полимерные банки, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия; по 10 и 20 кг в мешки из бумаги и комбинированных материалов соответствующей вместимости.

Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят Эйметерм диклазурил в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до

25 °С. Препарат, расфасованный в пакеты и мешки, хранят при указанных условиях в защищенном от влаги месте.

6. Эйметерм диклазурил следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Эйметерм диклазурил относится к антикокцидийным препаратам группы бензенацетонитрилов.

10. Входящий в состав препарата диклазурил активен в отношении большинства видов кокцидий (эймерий), паразитирующих у птиц, в том числе *E. acervulina*, *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. mitis*, *E. praecox*, *E. adenoides*, *E. gallopavonis*, *E. meleagrimitis*. Наиболее чувствительны к препарату бесполое формы эндогенного цикла развития кокцидий.

Механизм действия диклазурила заключается в нарушении процессов внутриклеточного метаболизма, что приводит к гибели кокцидий на всех стадиях развития.

При пероральном введении препарата диклазурил плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает свое антикокцидийное действие на слизистой и подслизистой оболочках кишечника. Выводится из организма птиц преимущественно в неизменном виде с пометом.

Эйметерм диклазурил по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах хорошо переносится птицами, не обладает мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим и тератогенным действием.

## III. Порядок применения

11. Эйметерм диклазурил назначают с лечебно-профилактической целью при кокцидиозе цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур до 16-недельного возраста.

12. Запрещается применение Эйметерма диклазурила курам-несушкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста, в связи с накоплением диклазурила в яйцах.

13. При работе с Эйметермом диклазурилом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эйметермом диклазурилом. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую



тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Эйметерм диклазурил не предназначен для применения млекопитающим.

15. Эйметерм диклазурил применяют в смеси с кормом в дозе 500 г на 1 тонну корма:

- цыплятам-бройлерам с первого дня жизни в течение всего периода выращивания и исключают из рациона за 5 дней до убоя;

- ремонтному молодняку кур с первого дня жизни до 16-недельного возраста.

Для равномерного распределения лекарственного препарата суточную дозу Эйметерма диклазурила смешивают с небольшим количеством комбикорма (1:9), а затем при тщательном перемешивании вносят в корм, рассчитанный на потребление птицей в течение суток.

В «челночных» программах использования антикокцидийных средств Эйметерм диклазурил применяют после ионофорного или другого химического препарата.

Эйметерм диклазурил термостабилен, что дает возможность вводить препарат в состав кормов, технология производства которых включает кратковременную термообработку.

16. При применении Эйметерма диклазурила в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у птиц, как правило, не наблюдается.

17. При значительной передозировке лекарственного препарата у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

18. Эйметерм диклазурил не следует применять одновременно с другими антикокцидийными препаратами. Информация о несовместимости Эйметерма диклазурила с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками, применяемыми в птицеводстве, отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске очередной дозы препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренной дозе и схеме применения.

21. Убой птиц на мясо разрешается не ранее чем через 5 суток после последнего применения Эйметерма диклазурила. Мясо птиц, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1/11.

Наименование, адрес и телефон организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1/11. Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93. Информация о лекарственном препарате размещена на сайте [www.avzvet.ru](http://www.avzvet.ru).

Генеральный директор  
ООО «НВЦ Агроветзащита»



С.В. Енгашев